


Cara Memberi Ubat Suntikan di bawah Kulit (Melalui Kanula Subkutan)


1

Ini adalah kanula subkutan.




2

Doktor atau jururawat akan memasukkan kanula subkutan untuk pesakit. Pastikan bahagian pada permukaan kanula bersih dan tidak merah.



3

Pastikan ubat yang akan diberi melalui picagari yang diisi adalah betul. Sediakan Normal Saline 0.9% yang diisi dalam picagari. Pastikan tarikh pada kedua-duanya tidak luput.




4

Basuh tangan dengan menggunakan sabun dan keringkan tangan anda. Doktor / jururawat akan menasihati anda jika anda boleh menyuntik ubat terus ke penyumbat ini (4a) atau anda perlu menanggalkan penutupnya (4b).




4A

TANPA MENANGGALKAN PENUTUP
Gunakan kertas alkohol untuk membersihkan penyumbat. Pasangkan picagari ubat ke kanula dengan menggunakan gerakan memutar.



4B

MENANGGALKAN PENUTUP
Gunakan kertas alkohol untuk membersihkan port pembukaan. Pasang picagari ubat ke port kanula menggunakan gerakan memutar.




Imbas kod QR untuk
informasi lebih lanjut

Cara Memberi Ubat Suntikan di bawah Kulit (Melalui Kanula Subkutan)

5

Pastikan sepit tidak tertutup.




6

Tekan hujung picagari dengan perlahan untuk memasukkan ubat ke dalam tiub.




7

Buka penutup picagari ubat dengan menggunakan gerakan memutar. Kemudian pasang picagari Normal Saline yang telah diisi menggunakan Gerakan memutar. Perlahan-lahan tekan hujung picagari untuk menyuntik Normal Saline ke dalam tiub.



8

Tekan sepit untuk menutupkan saluran. Pasangkan penutup ke kanula, jika ada.



9

Buang picagari yang telah digunakan. Catat tarikh dan waktu pemberian ubat dan pantau simptom jika perlu



Imbas kod QR untuk
informasi lebih lanjut