


# Paano magbigay ng gamot na pang-iniksyon sa pamamagitan ng isang cannula sa ilalim ng balat


1

Ito ay cannula.




2

Mga doktor / nars ang maglalagay ng cannula sa ilalim ng balat ng pasyente. Tiyaking malinis ang site at hindi pula.



3

Tiyaking tama ang gamot na ibibigay. Maghanda ng *normal saline* para sa *flushing*.



4


Hugasan at patuyuin ang iyong mga kamay. Papayuhan ka ng iyong doktor / nars kung maaari kang mag-iniksyon ng gamot nang direktso sa stopper na ito (4a) o kailangan mong alisin ang takip (4b).



4A

## DIRECTA SA STOPPER


Gumamit ng *alcohol swab* upang linisin ang *stopper*. Ikabit ang hiringgilya (syringe) sa *stopper* ng kanula sa pamamagitan ng patuloy na pag ikot hanggang sa mai-lock ito.



4B

## TANGGALIN ANG CAP

Gumamit ng *alcohol swab* upang linisin ang cap. Ikabit ang hiringgilya (syringe) sa canula sa pamamagitan ng patuloy na pag ikot hanggang sa mai-lock ito.




I-scan para sa i pang impormasyon

# Paano magbigay ng gamot na pang-iniksyon sa pamamagitan ng isang cannula


5

Tiyaking nakabuka ang *clamp*.




6

Dahan-dahang ibigay ang gamot sa loob ng hiringgilya (syringe).




7

Tanggalin ang syringe pamamagitan ng pag papaikot nito. Pagkatapos ay gamitin ang syringe na may lamang *normal saline* at dahan dahang iflush ito sa tubing.



8

Pindotin para maisara.. Ibalik and *cap* sa cannula kung kinakailangan.



9

Itapon ang ginamit na *syringe*. Isulat ang petsa at oras ng pagbigay ng iniksyon, at obserbahan kung bumutii ng sintomas.



I-scan para sa i pang impormasyon