

உபசரிப்புகளை (சப்போசிட்டுரி) எப்படி வழங்குவது

1


மருந்து சரியானதா என்பதை
உறுதிப்படுத்தவும்

Acetaminophen Suppositories
USP, 650 mg

Bisacodyl Suppositories 10mg


2

உங்கள் கைகளைக் கழுவி ஒரு
ஜோடி கையுறைகளை அணியுங்கள்




3

உறையை திறக்கவும். 'சப்போசிட்டுரி'
மீது மசகு எண்ணெய் தடவவும்




4

உங்கள் அன்புக்குரியவரின்
முழங்கால்களை வயிற்றை நோக்கி
இழுத்தபடி அவரைப் படுக்க வைக்கவும்.
உங்கள் அன்புக்குரியவரின் பின்னால்
நின்று, ஆசனவாயை வெளிப்படுத்த
பிட்டத்தைப் பிரிக்கவும்.



5

'சப்போசிட்டுரியின்' குறுகலான முனை முதலில்
செருகப்படுகிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
உங்கள் ஆள்காட்டி விரல் போகும் வரை,
மலக்குடலின் சுவரோடு உள்ள ஆசனவாயில்
மெதுவாக முழு சப்போசிட்டுரியையும்
செருகவும்.



6

கையுறைகளை அகற்றி உங்கள்
கைகளை கழுவவும்.



மேலும் விளக்கங்களுக்கு இங்கே
'ஸ்கேன்' செய்யவும்